



Thrombose-Prophylaxe bei internistischen Patienten

Prof. Dr. med. A.R. Huber
Chefarzt

Risikogruppe	Niedrig	Mittel	Hoch
Kriterien	<ul style="list-style-type: none">- Medizinische Abklärungen- Mobile Patienten- Alter < 70	<ul style="list-style-type: none">- Immobilisation- Pneumonie- schwere Entzündung (M. Crohn, Colitis ulcerosa u.a.m.)- BMI 25-29	<ul style="list-style-type: none">- Immobilisation- Karzinom- Anamnestiche Thromboembolie (TVT/Lungenembolie)- BMI > 30- Alter > 70- Gefässpatienten
Prävention	Frühmobilisation und ev. elastische Kompressionsstrümpfe	Fragmin ^o 2'500 E sc/Tag und Kompressionsstrümpfe	Fragmin ^o 5'000 E Fragmin sc/Tag und Kompressionsstrümpfe

Literatur

1. Antithrombotic and Thrombolytic Therapy: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008 Jun;133(6 Suppl)
2. 8. ACCP Guidelines on Antithrombotic Therapy. Neuigkeiten, kommentiert von Schweizer Experten. Schweiz. Med Forum 2009;9(23,24,25,26 und 30)
3. 8. ACCP Guidelines on Antithrombotic Therapy. Kommentaare von Schweizer Experten. Pipette Oktober 2009;5
4. Eriksson Bl. et al. Oral rivaroxaban fort he prevention of symptomatic venous thromboembolism after elective hip and knee replacement. J Bone Joint Surg Br. 2009 May;91(5):636-44