

Thrombose-Prophylaxe

Frauenklinik OP

Prof. Dr. med. A.R. Huber
Chefarzt

Art des Eingriffes	Dauer	<u>Risiko tief</u>	<u>Risiko mittel</u>	<u>Risiko hoch</u>
		Alter <40 Jahre	Alter ≥40 HRT / Varikosis BMI ≥27 – 29 kg/ m ²	Alter >60 Neoplasie/Thrombophilie Anamnese, TVT,LE BMI (≥30 kg/m ²)
<ul style="list-style-type: none"> • Hysteroskopie • Fraktionierte Curettage • Abort-Curettage • Mamma PE • Laparoskopische Sterilisation • Diagnostische Laparoskopie • Konisation • Tension free Vaginal Tape 	1 x prä- oder postoperativ (Zeitverhältnisse bei EDA/Spitalanästhesie beachten!)	Frühmobilisation	Fragmin ^o 2'500 E s.c./Tag und Kompressionsstrümpfe	Fragmin ^o 5'000 E s.c./Tag und Kompressionsstrümpfe
<ul style="list-style-type: none"> • Abdominale Hysterektomie • Vaginale Hysteroskopie • Descensus Eingriffe • Mamma-Eingriffe • Staging Laparatomie • Interventionelle Laparatomie 	bis Austritt	Fragmin ^o 5'000 E s.c./Tag und Kompressionsstrümpfe	Fragmin ^o 5'000 E s.c./Tag und Kompressionsstrümpfe	Fragmin ^o 5'000 E s.c./Tag und Kompressionsstrümpfe

^ogute Evidenz: s. Literatur 1, 2 und 3